



# موسم کی صورت حال کے مطابق جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کے لئے زرعی سفارشات



محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان اور محکمہ موسمیات پاکستان اسلام آباد کا مشترکہ منصوبہ

27 سے 29 اپریل 2026

موسم کی موجودہ صورت حال کے مطابق جنوبی پنجاب میں اکثر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور سوموار اور منگل کے دوران بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ رات کو کم سے کم 26 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا کی اوسط رفتار 4 سے 13 کلومیٹر فی گھنٹہ رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی موجودہ صورت حال کے مطابق زرعی سفارشات درج ذیل ہیں۔

## کپاس

موسم کی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے کپاس کی بروقت بجائی کریں۔ زمین میں گہرا اہل چلائیں۔ پچھلی فصل کے باقیات کو زمین میں ملائیں تاکہ بجائی میں دشواری نہ ہو۔ بجائی کے لئے علاقے کی مناسبت سے منظور شدہ اقسام کا اچھی کوالٹی کے بیج کا انتخاب کریں۔ منظور شدہ اقسام میں سی سی 1، سی سی 3، سی سی 6، سائیٹو 537، ایم این ایچ 1050، نیاب 1011، نیاب سناپ ایم، سی آئی ایم 785، آئی آر نیجی 19، ایف ایچ انمول۔ بی ایس 52 قابل ذکر ہیں۔ کھیلیوں پر کاشت کے لئے 75 فیصد سے زائد گاؤ والا بیج 6 سے 8 کلوگرام استعمال کریں۔ کھیلیوں کے درمیان فاصلہ اڑھائی فٹ اور پودوں کے درمیان فاصلہ 12 انچ رکھیں۔ بیتلے علاقے جہاں کپاس کی کاشت بذیغہ ڈرل کی جاتی ہے وہاں راؤنی بھر کے کریں اور کپاس کی کاشت تروتز میں کریں۔ ڈرل کاشتہ فصل میں بیج 2 سے 3 کلوگرام فی ایکڑ زیادہ استعمال کریں۔ ضرورت سے زیادہ 10 فیصد بیج کا بندوبست کریں تاکہ ناخن پر کیے جاسکیں۔ بیج کو کیزوں اور بیماریوں سے تحفظ کے لئے زہر آلود کریں اور بجائی کے لئے استعمال کریں۔ کپاس کی پٹرپوں پر کاشت کی صورت میں پہلا پانی تین سے چار دن بعد دیں جبکہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا پانی 6 سے 9 دن کے وقفے سے دیں۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی کے سلسلے میں کپاس کی بجائی سے پہلے پینڈی میتھلین بحساب 1200 ملی لیٹر فی ایکڑ استعمال کریں یا بجائی کے فوراً بعد 24 گھنٹے کے اندر ایس ٹیٹا کور بحساب 800 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کریں۔

## گندم

موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کی کٹائی کریں۔ گندم کی کٹائی اور گہائی جلد از جلد مکمل کریں۔ جہاں ممکن ہو گندم کی کٹائی کمبائن ہارویسٹر یا پیر سے کروائیں تاکہ جلد از جلد کٹائی کا عمل مکمل کر کے اگلی فصل (کپاس، مونگ، تل وغیرہ) وقت پر کاشت کی جاسکے۔ گندم کی اگلی فصل کا بیج رکھنے کے لئے ایسے کھیت کا انتخاب کریں جو جڑی بوٹیوں سے پاک ہو۔

## کماڈ

کماڈ کی آبپاشی کا وقفہ موسم کی مناسبت سے 10 سے 12 دن رکھیں۔ پچھتی کاشتہ بہاریہ کماڈ میں نائٹروجنی کھاد کی پہلی قسط جلد از جلد دیں۔ کماڈ کا گاؤ مکمل ہونے کے ایک ماہ بعد سیاڑوں کے درمیان بذریعہ کلٹیویٹر گوڈی کریں۔ کماڈ میں کالی کیزی (بلک بگ) کے حملے کی صورت میں محکمہ زراعت کی مشاورت سے زہروں کا استعمال کریں۔

## آم

حسب ضرورت آبپاشی جاری رکھیں۔ آم کے پودوں کو گرمی سے بچائیں۔ چھوٹے پودوں کو گرمی سے بچانے کے لئے باغ میں جنتر لگائیں اور جب جنتر 4 سے 5 فٹ کا ہو جائے تو اس کو اوپر سے کاٹ دیں۔ جن اقسام میں پھل گچھوں کی شکل میں ہے وہاں روزانہ کی بنیاد پر پودے کی چھتری کے اندر سایہ دار جگہ پر آم کے گچھوں کا معائنہ کرتے رہیں اور بورر کے حملے کی صورت میں محکمہ زراعت کی مشاورت سے مناسب زہروں کا سپرے کریں۔ پودوں پر بورر کی جلد تلافی کریں تاکہ یہ اپنے گرد نواح میں پھل کو متاثر نہ کرے۔ کٹے ہوئے بورر کو پودوں سے باہر دھوپ میں پھیلا دیں تاکہ یہ پھل کے بورر کی آماج گاہ نہ بن سکے۔ آم کے تیلے اور تھرپس کے تدارک کے لئے محکمہ زراعت کے عملہ کی مشاورت سے سپرے کریں۔ بیمار اور کمزور پودوں کی صحت کی بحالی کے لئے پودوں کی چھتری کے نیچے سے 10 فٹ کے فاصلے پر کھالی (ٹریٹینج) بنائیں۔ بڑے باغ میں نئے/چھوٹے پودوں میں حفاظتی تہہ (ٹیچ) کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ باغ میں زمینی لیول کو بہتر بنائیں۔