



موسم کی صورت حال کے مطابق جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کے لئے زرعی سفارشات



محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان اور محکمہ موسمیات پاکستان اسلام آباد کا مشترکہ منصوبہ

6 سے 8 اپریل 2026

موسم کی موجودہ صورت حال کے مطابق جنوبی پنجاب میں اکثر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود اور بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ رات کو کم سے کم 11 سے 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا کی اوسط رفتار 3 سے 11 کلومیٹر فی گھنٹہ رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی موجودہ صورت حال کے مطابق زرعی سفارشات درج ذیل ہیں۔

کپاس

موسم کی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے کپاس کی فصل کی بروقت بجائی کے لئے زمین کی تیاری کریں۔ پچھلی فصل کے باقیات کو زمین میں ملائیں تاکہ بجائی میں دشواری نہ ہو۔ بجائی کے لئے علاقے کی مناسبت سے منظور شدہ اقسام کا اچھی کوالٹی کے بیج کا انتخاب کریں۔ منظور شدہ اقسام میں سی کے سی 1، سی کے سی 3، سی کے سی 6، سائیڈو 537، ایم این ایچ 1050، نیاب 1011، نیاب سناپ ایم، سی آئی ایم 785، آئی آر نیبھی 19، ایف ایچ ایمول۔ بی ایس 52 قابل ذکر ہیں۔ کھلیوں پر کاشت کے لئے 75 فیصد سے زائد اگاؤ والا بیج 6 سے 8 کلوگرام استعمال کریں۔ کھلیوں کے درمیان فاصلہ اڑھائی فٹ اور پودوں کے درمیان فاصلہ 12 انچ رکھیں۔ تیلے علاقے جہاں کپاس کی کاشت بذریعہ ڈرل کی جاتی ہے وہاں راؤنی بھر کے کریں اور کپاس کی کاشت تروتز میں کریں۔ ڈرل کا شیشہ فصل میں بیج 2 سے 3 کلوگرام فی ایکڑ زیادہ استعمال کریں۔ ضرورت سے زیادہ 10 فیصد بیج کا بندوبست کریں تاکہ نافعہ پر کیے جاسکیں۔ بیج کو کیڑوں اور بیماریوں سے تحفظ کے لئے زہر آلود کریں اور بجائی کے لئے استعمال کریں۔

گندم

زرعی زہروں کے استعمال کے بعد بیج جانے والی جڑی بوٹیوں خاص طور پر دمبی سٹی اور جنگلی جئی کو ہاتھ سے تلف کریں تاکہ ان جڑی بوٹیوں کے بیج کپک کر گندم کے ساتھ نہ مل جائیں۔ موسمی پیشین گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم کی کٹائی اور گہائی کا بندوبست کریں۔ ترجیحاً کٹائی کے لئے کمبائن ہارویسٹر استعمال کریں۔

کماڈ

کماڈ کی بہاریہ کاشت جلد از جلد مکمل کریں۔ دیر سے کاشتہ فصل میں 10 سے 15 فیصد بیج کا اضافہ کریں۔ کاشت کے لئے منظور شدہ اقسام کا بیج استعمال کریں۔ کماڈ کی بجائی 4 فٹ کے فاصلے پر بنائی گئی گہری کھلیوں اور کھلے سیاڑوں میں کریں اور ہر کھلی میں سموں کی دو قطاریں لگائیں۔ کاشت کے لئے 2 آنکھوں والے سے 30 ہزار اور 3 آنکھوں والے سے 20 ہزار استعمال کریں۔ اس کے لئے 12 سے 16 مرلہ کماڈ درکار ہو گا۔ بجائی کے لئے 3 فیصد ٹاپسین ایم کے محلول میں ڈبو کر کماڈ کی کاشت کے لئے استعمال کریں۔ کماڈ کی کاشت کے ایک تا دو دن بعد ورتھ حالت میں محکمہ زراعت کی مشاورت سے اگاؤ سے پہلے والی جڑی بوٹی مار ادویات کا سپرے کریں۔

آم

آم کے پودوں پر پھل بننے کا عمل اختتامی مراحل میں ہے۔ اس وقت پودوں پر بٹور بن چکا ہے اس کی جلد تلافی کریں تاکہ یہ اپنے گرد و نواح میں پھل کو متاثر نہ کرے۔ کئے ہوئے بٹور کو پودوں سے باہر دھوپ میں پھیلا دیں تاکہ یہ پھل کے بورر کی آماج گاہ نہ بن سکے۔ آم کے تیلے اور تھرپس کے تدارک کے لئے محکمہ زراعت کے عملہ کی مشاورت سے سپرے کریں۔ بیمار اور کمزور پودوں کی صحت کی بحالی کے لئے پودوں کی چھتری کے نیچے تنے سے 10 فٹ کے فاصلے پر کھالی (ٹریٹینج) بنائیں۔ بڑے باغ میں نئے / چھوٹے پودوں میں حفظانی تہہ (ٹچ) کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ باغ میں زمینی لیول کو بہتر بنائیں۔