



موسم کی صورت حال کے مطابق جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کے لئے زرعی سفارشات



ایم این اےس زرعی یونیورسٹی ملتان اور محکمہ موسمیات پاکستان اسلام آباد کا مشترکہ منصوبہ

11 سے 14 جون 2026

موسم کی موجودہ صورت حال کے مطابق جنوبی پنجاب کے اکثر اضلاع میں جمعہ سے اتوار کے درمیان بارش کا امکان ہے۔ اس دوران دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ رات کو کم سے کم 28 سے 34 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا کی اوسط رفتار 3 سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ رہنے کا امکان ہے زیادہ تر اضلاع میں تیز ہوا چلنے کا امکان ہے۔ موسم کی موجودہ صورت حال کے مطابق زرعی سفارشات درج ذیل ہیں۔

کپاس

جہاں فاسفورسی کھادیں بجائی کے وقت نہیں ڈالی گئیں وہاں چھدرائی کے فوراً بعد (20 سے 25 دن بعد) وتر حالت میں ڈالیں۔ نائٹروجنی کھاد بجائی کے بعد 3 سے 4 اقساط میں دیں۔ جڑی بوٹیوں کی تلافی پر خصوصی توجہ دیں۔ گوڈی اور رجز کی مدد سے جڑی بوٹیاں کنٹرول کریں۔ موسمی حالت اور گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے کپاس کی آبپاشی بروقت کریں۔ لائنوں میں کاشتہ فصل میں پہلی آبپاشی بجائی کے 30 سے 35 دن بعد جبکہ پٹرپوں پر کاشتہ فصل میں پانی 6 سے 9 دن کے وقفے سے لگائیں۔ کھیت میں باقاعدگی سے پیسٹ سکاؤٹنگ کرتے رہیں۔ پہلا سپرے حتیٰ الوسع تاخیر سے کریں تاکہ دوست کیڑے پرورش پاسکیں۔ کیڑوں کے حملہ کی صورت میں نقصان کی معاشی حد کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ زراعت کے عملہ کی مشاورت سے تدارک کریں۔

کماڈ

کماڈ کی آبپاشی پر خصوصی توجہ دیں۔ کماڈ کی آبپاشی کا وقفہ موسم کی مناسبت سے 8 سے 10 دن رکھیں۔ کماڈ میں تنے کے گرد مٹی چڑھانے سے پہلے گوڈی مکمل کریں۔ کماڈ کی ایسی فصل جو 90 سے 100 دن کی ہو چکی ہے وہاں نائٹروجنی کھاد کی آخری قسط مٹی چڑھاتے وقت ڈالیں۔ کماڈ کے گروووں کے انسداد کے لئے محکمہ زراعت کی سفارشات پر عمل کریں۔

آم

اگتی اقسام کی برداشت سے 10 سے 12 دن پہلے آبپاشی بند کر دیں۔ پھل کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لئے حسب ضرورت آبپاشی کا خیال رکھیں۔ باغ کی زمیں میں وتر آنے کے فوری بعد دوبارہ آبپاشی کا بندوبست کریں۔ آم کے پودوں کو گرمی سے بچانے کے لئے مٹی سے جولائی کے دوران جڑی بوٹیوں کی تلافی نہ کریں۔ آم کی پھل کی مکھی کنٹرول کے لئے پودے کے نیچے گرے ہوئے پھل ہر دوسرے دن اٹھائیں اور باغ سے باہر دھوپ والی جگہ پر بکھیر دیں یا گرے ہوئے پھل کو گڑھا بنا کے زمین میں دفن کر دیں۔ جب تک پھل باغ میں موجود ہے صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نر مکھی کے تدارک کے لیے میتھائیل یوجینال کے پھندوں کا استعمال کریں۔ ایک ایکڑ میں کم از کم 4 سے 6 جنسی پھندے لگائیں۔ اور یہ پھندے ہر دسویں دن تبدیل کریں۔ آم کے سکیل کے حملہ کی مانیٹرنگ کے لئے سایہ دار جگہ پر پھل کا بغور جائزہ لیتے رہیں۔ پھل کے بورر اور سکیل کے تدارک کے لئے محکمہ زراعت کے عملہ کی مشاورت سے سپرے کریں۔ بہار اور کمزور پودوں کی صحت کی بحالی کے لئے پودوں کی چھتری کے نیچے تنے سے 10 فٹ کے فاصلے پر کھالی (ٹریپنگ) بنائیں۔ بڑے باغ میں نئے / چھوٹے پودوں میں حفاظتی تہہ (لچ) کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ باغ میں زمینی لیول کو بہتر بنائیں۔