



موسم کی صورت حال کے مطابق جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں کے لئے زرعی سفارشات



محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان اور محکمہ موسمیات پاکستان اسلام آباد کا مشترکہ منصوبہ

29 جون سے 1 جولائی 2026

موسم کی موجودہ صورت حال کے مطابق جنوبی پنجاب کے اکثر اضلاع میں مطلع صاف رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران دن کے وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ رات کو کم سے کم 30 سے 34 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا کی رفتار 9 سے 22 کلومیٹر فی گھنٹہ رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی موجودہ صورت حال کے مطابق زرعی سفارشات درج ذیل ہیں۔

کپاس

آپاشی کے لئے موسمی پیش گوئی کو مد نظر رکھیں۔ ڈوڈی اور پھول آنے کے دوران پانی کی کمی نہ آنے دیں۔ تاہم پھول ڈوڈی آنے کے دوران پانی اور کھاد کا مناسب استعمال کریں۔ جہاں فاسفورسی کھاد مکمل ہو چکی ہے وہاں نائٹروجنی کھاد کے سلسلے میں امونیم سلفیٹ یا کمین (گوارہ) ایک بوری فی ایکڑ ڈالیں۔ نائٹروجنی کھاد بجائی کے بعد 3 سے 14 اقساط میں دیں۔ جڑی بوٹیوں کی تعلق پر خصوصی توجہ دیں۔ گوڈی اور رجر کی مدد سے جڑی بوٹیاں کنٹرول کریں۔ کھیت میں باقاعدگی سے پیسٹ سکاؤٹنگ کرتے رہیں۔ کپاس میں گلابی سٹی کی نگرانی کے لئے 1 جنسی پھندانی 15 ایکڑ کے حساب سے لگائیں۔ گلابی سٹی کے حملے کی صورت میں مدھانی نما پھول توڑ کر زمیں میں دبا کر تلف کریں۔ گلابی سٹی کے تدارک کے لئے غیر ضروری سپرے ہرگز نہ کریں۔ پہلا سپرے حتیٰ الوسع تاخیر سے کریں تاکہ دوست کیڑے پرورش پاسکیں۔ کیڑوں کے حملہ کی صورت میں نقصان کی معاشی حد کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ زراعت کے عملہ کی مشاورت سے تدارک کریں۔

کماڈ

کماڈ کی آپاشی پر خصوصی توجہ دیں۔ موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کماڈ کی آپاشی کا وقفہ 10 سے 12 دن رکھیں۔ کماڈ میں جہاں نائٹروجنی کھادیں ڈال کر مٹی نہیں چڑھائی گئی وہاں جلد از جلد مٹی چڑھائیں۔ مٹی چڑھانے کے بعد پانی لگائیں اور ایس میٹھلا کلور بھسبھاس ایک لیٹر فی ایکڑ ڈالیں۔ کماڈ کے گڑووں کے انسداد کے لئے محکمہ زراعت کی سفارشات پر عمل کریں۔

آم

موجودہ موسمی حالات کے مطابق درمیانی اقسام کی آپاشی روک دیں اور پچھیتی اقسام میں حسب ضرورت آپاشی جاری رکھیں۔ اگیتی اقسام میں کھاد ڈال کر آپاشی کریں۔ جن اقسام کا پھل توڑ لیا ہے اس میں بعد از برداشت خوراک ڈالیں۔ یاد رہے کھاد دینے میں تاخیر سے پودوں کی پھل دینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگیتی اقسام میں لگائے گئے پھل کی مکھی کے لئے جنسی پھندے اتار کر درمیانی اور پچھیتی اقسام میں منتقل کریں تاکہ وہاں جنسی پھندوں کی تعداد بڑھائی جاسکے۔ حسب ضرورت آپاشی کا خیال رکھیں۔ آم کی پھل کی مکھی کے کنٹرول کے لئے پودے کے نیچے گرے ہوئے پھل ہر دو سرے دن اٹھائیں اور باغ سے باہر دھوپ والی جگہ پر بکھیر دیں یا گرے ہوئے پھل کو گڑھانا کے زمین میں دفن کر دیں۔ جب تک پھل باغ میں موجود ہے صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نر مکھی کے تدارک کے لئے میتھائیل پوجینال کے پھندوں کا استعمال کریں۔ ایک ایکڑ میں کم از کم 4 سے 6 جنسی پھندے لگائیں۔ اور یہ پھندے ہر دو سو دن تبدیل کریں۔ اگر دو پہر کے وقت آم کے تنے اور ٹہنوں پر تیل نظر آئے تو اس جگہ پر مناسب کیڑے مار ادویات کا سپرے کریں۔ آم کے تیل کا بروقت تدارک کریں۔ بیمار اور کمزور پودوں کی صحت کی بحالی کے لئے پودوں کی چھتری کے نیچے تنے سے 10 فٹ کے فاصلے پر کھالی (ٹریٹینج) بنائیں۔ بڑے باغ میں نئے / چھوٹے پودوں میں حفاظتی تہ (لچ) کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ باغ میں زمینی لیول کو بہتر بنائیں۔